


# PARVOVIRUS CANINO



¿Qué es parvovirus canino?

## ¿Qué es?

Es un virus transmitido principalmente a través de las heces de otros perros.

Es altamente contagioso.

Tanto los animales que viven dentro y fuera de la casa pueden ser infectados.

Afecta solamente a perros.

## Síntomas

Disminución en el consumo de agua

Sopor o falta de energía

Falta de apetito

Diarrea

Vomito

## Factores de riesgo

Perros jóvenes

Perros de pelaje oscuro como Dobermans o Rottweilers

Falta de vacunación

Prevención por Vacunación es el único método de proteger a su perro.

Los documentos fueron desarrollados por Jessica Hammer, como parte de su requisito de tesis para Barrett, la Universidad de honor en ASU, con el apoyo de los veterinarios mentores.

Prevención por vacunación es el único método de proteger a su perro de esta enfermedad.

Siga leyendo para más información sobre prevención, vacunación, y tratamiento.

# PREVENCIÓN POR VACUNACIÓN

## Puntos de importancia

### Diagnóstico de Parvovirus

Si su perro muestra algunos de estos síntomas debe consultar a su veterinario. En el consultorio del veterinario su veterinario hace un examen de parvovirus para detectar si su perro está infectado.

### Tratamiento de Parvovirus


Si su perro está infectado con el parvovirus canino se usarán diferentes tipos de terapias incluyendo:

**Fluidos intravenosos (suero):** para prevenir la deshidratación

**Hospitalización:** por varios días

**Antibióticos:** para prevenir infecciones

**Analgésicos:** para prevenir dolor



### Prevención de Parvovirus

Para prevenir parvovirus los perros deben recibir vacunas de parvovirus desde la edad de nueve semanas y luego cada dos-tres semanas hasta 16 semanas de edad. Los perros adultos deben ser vacunados cada año hasta los tres años de edad – después de los tres años deben vacunarse cada tres años. Se debe limitar la actividad de su perro hasta las 16 semanas de edad, y no debe salir de su casa hasta las 16 semanas de edad.

### Definiciones

**Fluidos intravenosos (suero):** un tubo delgado se inserta en la vena de su perro para administrar fluidos

**Sopor:** falta extrema de energía o actividad

**Vacuna:** una inyección administrada por veterinarios para proteger a su perro de enfermedades

**Virus:** un agente infeccioso que enferma a su perro

Prevención por vacunación es el único método de proteger a su perro.

Parvovirus es una enfermedad fatal y es importante vacunar a perros de todas las edades.

Se debe limitar la actividad de un perro hasta que haya recibido todas las vacunas necesarias y tenga 16 semanas de edad.

Perros jóvenes deben evitar:

- Ir a parques
- Caminar fuera de la casa
- Jugar con otros perros

Si su perro muestra algunos de estos síntomas debe consultar a su veterinario.